

Especies de aves más abundantes

Ansares: ave de gran tamaño con escasa diferencia entre los sexos.

Ansar común: la más abundante en la Reserva, (concentraciones de hasta 40.000 ejemplares), abundan sobre todo entre noviembre y febrero.

Ansar campestre: actualmente de escasa presencia en la Reserva.

Ansar Careto: entre 10 y 50 ejemplares aparecen cada año.

Barnaclas: aves invernantes de mediano tamaño, se localizan algunos ejemplares de la Barnacla cariblanca entre los ansares.

Tarros: aves de tamaño mediano con plumaje muy vistoso, se pueden ver muy pocos ejemplares de Tarro Blanco que invernan en las lagunas.

Patos de superficie: de pequeño tamaño con diferente coloración de plumaje entre machos y hembras.

Azulón: abundan durante todo el año, pero sobre todo en noviembre, se han llegado a encontrar concentraciones de 15.000 ejemplares.

Pato cuchara: abunda entre octubre y abril, sobre todo en el mes de marzo, algunas parejas llegan a nidificar.

Ánade Silbón: se puede encontrar entre noviembre y marzo y el número suele ser inferior a los 300 ejemplares.

Ánade Rabudo: inverna entre noviembre y abril y se puede ver sobre todo en el mes de febrero.

Ánade Friso: especie presente en la Reserva a lo largo de todo el año, con menos de 100 ejemplares.

Cerceta Común: anátida presente entre octubre y abril, con máximas concentraciones de hasta 3.500 aves en enero, alguna pareja ocasionalmente llega a criar.

Cerceta Carretona: se puede ver algún ejemplar entre febrero y abril.

Patos buceadores : patos de tamaño mediano con grandes diferencias entre sexos, algunos permanecen todo el año en las lagunas llegando a criar, destacan el porrón común y el porrón moñudo.